

Rezumat succint al informațiilor pentru pacient:

Impactul strategiei de transfuzie restrictivă comparativ cu cea liberală asupra leziunilor cardiace și decesului la pacienții supuși intervenției chirurgicale pentru fractură de șold (RESULT-Hip)

Sunteți invitat să participați la un studiu de cercetare. Vă rugăm să citiți cu atenție următorul rezumat scurt, care prezintă pe scurt studiul. Dacă, după ce îl citiți, doriți informații suplimentare, un membru al echipei de cercetare va fi foarte bucuros să discute pe larg cu dumneavoastră despre acesta și să vă furnizeze o fișă completă de informații. Aceasta nu vă obligă la nimic!

Scanați pentru a
viziona videoclipul

**De ce am fost invitat să particip la acest studiu?**

Ați fost invitat să participați deoarece v-ați fracturat șoldul. Puteți participa la studiu dacă deveniți anemic (aveți un nivel scăzut al hemoglobinei).

Care este scopul studiului?

Persoanele care sunt operate pentru fractură de șold pot dezvolta complicații după operație. Medicii consideră că administrarea de transfuzii de sânge persoanelor care devin anemice (au un nivel scăzut al hemoglobinei) în perioada din jurul intervenției ar putea reduce aceste complicații. Deși există cercetări în acest domeniu, nu este clar care este momentul optim pentru a recomanda transfuzii pacienților cu fractură de șold. Studiul nostru compară transfuziile administrate la două praguri diferite de anemie pentru a stabili care abordare este mai bună.

Trebuie să particip?

Nu, decizia vă aparține în întregime. Vă puteți răzgândi oricând, fără să oferiți un motiv. Dacă refuzați să participați, acest lucru nu va influența îngrijirea medicală pe care o primiți acum sau în viitor.

Ce se va întâmpla dacă particip?

Vom discuta în detaliu studiul cu dumneavoastră și vă vom solicita să semnați un formular de consimțământ informat. Dacă faceți anemie (hemoglobină ≤ 90 g/l) în perioada dintre internare și 7 zile după intervenția chirurgicală, vom utiliza un sistem computerizat pentru a vă repartiza aleatoriu într-unul dintre cele două grupuri. Un grup va primi transfuzii de sânge la un nivel mai ridicat al hemoglobinei (între 90–110 g/l), iar celălalt la un nivel mai scăzut (între 75–90 g/l). Vă vom monitoriza valorile hemoglobinei și veți primi transfuzii de sânge conform grupului în care vă aflați până la externare sau până la 30 de zile, oricare dintre aceste momente survine mai devreme. Vi se vor face și analize de sânge pentru a verifica hemoglobina, funcția rinichilor și inima. De asemenea, vi se va face o electrocardiogramă (ECG) și veți completa câteva chestionare scurte pe durata spitalizării. Participarea la studiu nu va prelungi durata spitalizării.

Vom utiliza, de asemenea, informațiile colectate din fișa dumneavoastră medicală pe durata spitalizării și până la patru luni după aceasta. De asemenea, vă vom contacta pentru a completa câteva chestionare de urmărire, fie prin telefon, fie pe cale poștală. **Nu este** necesar să reveniți la spital după externare pentru a efectua vizitele de urmărire.

Mai multe informații sunt disponibile la: <https://edin.ac/result-hip>

Vă mulțumim că v-ați făcut timp să citiți acest rezumat. Dacă doriți să aflați mai multe despre studiu, luați legătura cu XXXXXXXXXXXX din echipa de cercetare, care va discuta cu interes cu dumneavoastră și vă poate oferi fișa completă cu informații.

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX